利用铜催化 1,3-烯炔的区域选择性的 1,4-硒化磺酰化反应合成
氰烷基磺酰化的联烯衍生物

王世超 姜波*

(江苏师范大学化学与材料科学学院 江苏徐州 221116)

Copper-Catalyzed Regioselective 1,4-Selenosulfonylation of
1,3-Enynes to Access Cyanoalkylsulfonylated Allenes

Wang, Shichao Jiang, Bo*

(School of Chemistry & Materials Science, Jiangsu Normal University, Xuzhou, Jiangsu 221116)

作为一种重要的结构单元,联烯(又称丙二烯)广泛存在于天然产物、药物和材料分子中。此外,该类化合物在有机合成中是非常有价值的反应中间体^[1]。由于其独特的反应活性和重要的生物活性,在过去几十年间,联烯化学引起了有机化学和药物化学家们的广泛关注,已发展了众多用于制备多取代联烯的方法。合成联烯的经典方法主要包括亲核取代、 σ 重排和 β -消除等^[2-4],但这些方法通常需要使用预官能化的起始原料,在一定程度上限制了联烯化学的发展和应用。近年来,过渡金属和有机催化的 1,3-烯炔的 1,4-双官能化反应已发展成为快速制备多取代联烯类化合物的新途径^[5-6]。如 2018 年,刘国生课题组^[7]发展了一种通过配体调控 1,3-烯炔使其发生自由基引发的 1,2-和 1,4-加成反应,合成了三氟甲基取代的联烯腈类化合物。2021 年,麻生明课题组^[8]采用铜催化 1,3-烯炔的三组分反应,合成了各种官能化的丙二烯衍生物。尽管如此,通过二氧化硫插入策略使 1,3-烯炔发生自由基 1,4-双官能化制备磺酰化丙二烯衍

生物的方法鲜有文献报道。

最近,台州学院医药化工与材料工程学院吴劼课题组^[9]发展了一类铜催化 1,3-烯炔、二硒化物、DABCO·(SO₂)₂ 和环丁酮肟酯的四组分反应,经自由基引发的 1,4-硒磺酰化过程,高效地合成了一系列氰烷基磺酰化产物,即丙二烯基磺酰化物。在此研究过程中,作者没有观察到 1,2-加成产物的形成,而是直接得到了 1,4-加成产物(Scheme 1),展现了高度专一的区域选择性,这为药物分子的后期修饰提供了可供参考的合成策略。

在初步设计四取代联烯的合成策略后,作者首先对反应条件进行了优化。经系列筛选,得到了最佳反应条件:即使用 DABCO·(SO₂)₂ 为磺源,环丁酮肟酯为氰丙基源,二芳基硒醚为硒源, CuOAc 为催化剂, 1,2-二氯乙烷(DCE)作为溶剂, 60 °C 下进行反应。在此优化条件下,作者研究了 1,4-硒磺酰化反应底物的适用范围(Scheme 2)。首先更换了 1,3-烯炔结构上的取代基,如 R¹ 基团为酰胺、酰亚胺、酯和酮等, R² 为乙基和甲基时,都能很好

图式 1 铜催化 1,3-烯炔的 1,4-硒磺酰化反应

Scheme 1 Copper-catalyzed 1,4-selenosulfonylation of 1,3-enynes from sulfur dioxide

* Corresponding author. E-mail: jiangchem@jsnu.edu.cn. Published online October 15, 2021.

地兼容该反应; 接着, 作者考察了环丁酮肟酯上 R^4 取代基的范围. 各种带有苯基、酯、醚和烷基的底物均能以中等至良好的产率转化为目标产物. 值得一提的是: 使用带有 Boc 保护的氮杂环丁烷螺环酮肟酯也可顺利参与此反应, 得到含有氮杂环丁烷的四取代联烯衍生物. 在考察作为第三组分的二硒化物范围时, 作者发现含供

电子和吸电子基团的芳基及苄基硒醚均适合此反应. 不仅如此, 利用该反应还能对阿达帕林及萘普生衍生物等药物进行结构修饰.

基于一系列的控制实验和先前的文献报道, 作者提出了一种可能的反应机理(Scheme 3). 首先, 通过单电子转移过程, 环丁酮肟酯转化为亚氨基自由基, 后经

图式 2 铜催化 1,3-烯炔的 1,4-硒磺酰化底物范围

Scheme 2 Scope of the copper-catalyzed 1,4-selenosulfonylation of 1,3-enynes

图式 3 可能的反应机理

Scheme 3 Proposed mechanism

β -C—C 键断裂(四元环开环)形成羧丙基自由基^[10], 其被 SO₂ 迅速捕获产生羧丙基磺酰基自由基物种. 接着, 该磺酰基自由基与 1,3-烯炔发生加成, 经共振生成丙二烯基自由基, 随后与 Cu(I)反应生成 Cu(II)物种, 再与二苯基二硒化物作用, 产生 Cu(III)物种, 最后通过还原消除得到目标产物, 同时再生 Cu(I)催化剂完成催化循环. 此研究工作从容易获得且简单易制备的原料入手, 不仅为四取代联烯基硒化物的高效制备提供了一种可靠可行的合成方法, 而且还为二氧化硫插入反应在有机合成化学中的应用提供了很好的范本.

References

- [1] Hoffmann-Röder, A.; Krause, N. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2004**, *43*, 1196.
- [2] Liu, L.; Ward, R. M.; Schomaker, J. M. *Chem. Rev.* **2019**, *119*, 12422.
- [3] Neff, R. K.; Frantz, D. E. *ACS Catal.* **2014**, *4*, 519.
- [4] Huang, X.; Ma, S. *Acc. Chem. Res.* **2019**, *52*, 1301.
- [5] Fu, L.; Greßies, S.; Chen, P.; Liu, G. *Chin. J. Chem.* **2020**, *38*, 91.
- [6] Dong, X.; Zhan, T.; Jiang, S.; Liu, X.; Ye, L.; Li, Z.; Gu, Q.; Liu, X. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2021**, *60*, 2160.
- [7] Wang, F.; Wang, D.; Zhou, Y.; Liang, L.; Lu, R.; Chen, P.; Lin, Z.; Liu, G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, *57*, 7140.
- [8] Song, Y.; Fu, C.; Ma, S. *ACS Catal.* **2021**, *11*, 10007.
- [9] He, F. S.; Bao, P.; Yu, F.; Zeng, L. H.; Deng, W. P.; Wu, J. *Org. Lett.* **2021**, *23*, 7472.
- [10] Zuo, H.-D.; Zhu, S.-S.; Hao, W.-J.; Wang, S.-C.; Tu, S.-J.; Jiang, B. *ACS Catal.* **2021**, *11*, 6010.

(Zhao, C.)

更正

2021年第41卷第6期

DOI: 10.6023/cjoc202010029

齐墩果酸 C3-糖缀合物的设计、合成及抗流感病毒活性研究

邵亮^{†,a} 杨帆^{†,a} 李唯嘉^a 俞飞^{*,a,b}^(a) 昆明理工大学医学院 昆明 650500)^(b) 北京大学天然药物与仿生药物国家重点实验室 北京 100191)

第 2457 页图 2B 的纵坐标更正为 “Inhibition rate/%”, 图 3B 的图片更正如下: