双金属协同催化不对称串联环化反应——含相邻手性中心 γ -丁内酯衍生物的立体发散性精准合成

徐明华*

(南方科技大学化学系/深圳 Grubbs 研究院 广东省催化化学重点实验室 深圳 518055)

Stereodivergent Synthesis of Enantioenriched γ -Butyrolactones Bearing Two Vicinal Stereocenters Enabled by Synergistic Dual Metal Catalysis

Xu, Ming-Hua*

(Guangdong Provincial Key Laboratory of Catalysis, Shenzhen Grubbs Institute and Department of Chemistry, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055)

不同立体构型的手性药物的药效学或药动学行为通常不一样, 因此, 精准评价含多个手性中心化合物的所有光学异构体的药理活性和用途, 在手性药物研究中具有重要意义. 一般来说, 对于含多个手性中心的化合物, 利用传统的不对称合成方法通常仅能得到一种或两种主要的立体异构体, 而立体发散性合成则可以获得相应手性化合物的所有立体异构体, 因此受到化学家们的极大关注和重视.

光学活性的 γ -丁内酯结构单元是许多生物活性天然产物和药物分子的核心骨架^[1]. 近几十年来, 利用各种不对称合成方法构建 γ -丁内酯骨架已经取得了很大进展, 但是对于含两个相邻手性中心的 γ -丁内酯类化合物的所有四个光学异构体的立体发散性合成研究仍有待进一步探索^[2].

近几年来, 金属化亚甲胺叶立德(AMY)作为一类简便易得的 1,3-偶极子或亲核试剂, 利用其 C1 的亲核性和 C3 的亲电性, 在手性氮杂环、非天然 α -氨基酸及高烯丙胺类化合物的催化不对称合成研究中取得了一系列进展^[3](Scheme 1). 另一方面, 与上述基于 AMY 的 C1-/C3-反应性研究形成鲜明对比的是, AMY 中酯羰基 C2' 的潜在亲电性很少受到关注, 主要原因是 C2' 的亲电性相对较弱, 因此将金属化亚甲胺叶立德作为二原子反应组分用于相关不对称合成一直未见文献报道.

在前期金属化亚甲胺叶立德研究工作的基础上^[4-5], 武汉大学化学与分子科学学院王春江课题组近期设计了基于 AMY 的 C1 亲核性和 C2' 亲电性的串联亲核进攻并内酯化反应, 利用 Cu/Ir-双金属协同催化, 实现了亚胺酯(金属化 AMY 前体)和乙烯基碳酸亚乙酯两种外消

图式 1 金属化亚甲胺叶立德(AMY)在有机合成中的潜在应用

Scheme 1 Synthetic potential of N-metallated azomethine ylide (AMY) in organic synthesis

* Corresponding author. E-mail: xumh@sustech.edu.cn. Published online November 30, 2021.

旋体间的新型催化不对称串联烯丙基取代^[6]/内酯化反应,成功用于含两个连续手性中心的 γ -丁内酯类衍生物所有 4 个光学异构体的立体发散性可控合成^[7].

研究发现,在最优的反应条件下,反应对 16 种天然及非天然 α -氨基酸衍生的醛亚胺酯、甘氨酸衍生的酮亚胺酯及环状酮亚胺酯参与的手性 γ -丁内酯的立体发散性合成,都能得到优异的立体化学精准控制.反应中手性铜催化剂活化亚胺酯,现场生成带有亲电位点的亲核性的亚胺叶立德并进行立体化学调控,手性铱催化剂活化乙烯基碳酸亚乙酯生成带有亲核位点的亲电性烯丙基铱中间体,并控制新生成的烯丙基手性中心,两种不同手性催化剂在碳-碳键的立体发散性偶联进程中互不影响,且各自独立发挥作用;得到的烯丙基取代反应中间体含有多个活性官能团,如具有亲核性的烷氧基负离子、亲电性的亚胺和亲电性的酯羰基,尽管一般情况下亚胺的亲电性明显强于酯羰基,但生成五元内酯环比生成六元氮氧杂环从能量和产物的稳定性上来说更为有利,从而实现亚胺酯作为双原子组分参与的不对称串联环化反应,为含两个连续手性中心手性 γ -丁内酯类衍生物的立体发散性精准构建提供了一个简洁的方法(Scheme 2).

值得注意的是,几乎同时上海交通大学的张万斌课题组^[8]也基于双金属协同催化策略,在 Cu/Ir 或 Cu/Pd 手性催化剂存在下,同样利用 AMY 的 C1 亲核性和 C2' 亲电性,以环状酮亚胺酯与 2-乙烯基环氧乙烷为原料,高效地实现了不对称串联烯丙基取代/环化反应,成功用于一类含螺环结构有连续两个手性中心的 γ -丁内酯类

衍生物的立体发散性合成,并取得了优异的立体选择性控制(Scheme 3).

通过控制实验及反应机理研究,作者进一步揭示了双金属协同催化体系中不同手性铜/铱催化剂组合所涉及的催化剂/底物、催化剂/催化剂的相互作用,以及不同反应物投料比涉及到的动力学拆分或动态动力学拆分过程;同时基于含亲核位点的手性烯丙基铱络合物中间体单晶的培养及结构解析(图 1),对立体发散性合成手性 γ -丁内酯的立体化学提出了可能的解释(Scheme 4).

图 1 铱(III)- π -烯丙基络合物 30 的单晶结构
Figure 1 X-ray structure of the Ir(III)- π -allyl complex 30

图式 2 Cu/Ir 协同催化立体发散性合成手性 γ -丁内酯
Scheme 2 Stereodivergent synthesis of chiral γ -butyrolactone enabled by synergistic Cu/Ir catalysis

图式 3 双金属协同催化立体发散性合成含螺环手性 γ -丁内酯
Scheme 3 Stereodivergent synthesis of spiro chiral γ -butyrolactones enabled by synergistic dual metal catalysis

图式 4 可能的反应机理
Scheme 4 Proposed mechanism

References

- [1] (a) Seitz, M.; Reiser, O. *Curr. Opin. Chem. Biol.* **2005**, 9, 285.
(b) Snead III, O. C.; Gibson, K. M. *N. Engl. J. Med.* **2005**, 352, 2721.
- [2] Singha, S.; Serrano, E.; Mondal, S.; Daniliuc, C. G.; Glorius, F. *Nat. Catal.* **2020**, 3, 48.
- [3] (a) Hashimoto, T.; Maruoka, K. *Chem. Rev.* **2015**, 115, 5366.
(b) Adrio, J.; J. Carretero, C. *Chem. Commun.* **2019**, 55, 11979.
- [4] (a) Wei, L.; Chang, X.; Wang, C.-J. *Acc. Chem. Res.* **2020**, 53, 1084.
(b) Wei, L.; Wang, C.-J. *Chin. J. Chem.* **2021**, 39, 15.
- (c) Fang, X.; Wang, C.-J. *Org. Biomol. Chem.* **2018**, 16, 2591.
- [5] (a) Wang, C.-J.; Liang, G.; Xue, Z.-Y.; Gao, F. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, 130, 17250.
(b) Xue, Z.-Y.; Li, Q.-H.; Tao, H.-Y.; Wang, C.-J. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, 133, 11757.
- [6] Cheng, Q.; Tu, H.-F.; Zheng, C.; Qu, J.-P.; Helmchen, G.; You, S.-L. *Chem. Rev.* **2019**, 119, 1855.
- [7] Xiao, L.; Wei, L.; Wang, C.-J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2021**, 60, 24930.
- [8] Peng, Y.; Hong, X.; Luo, Y.; Wu, L.; Zhang, W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2021**, 60, 24941.

(Cheng, F.)