硒催化羰基衍生物的选择性转化

钟富明 赵晓丹*

(中山大学化学学院 有机化学研究所和生物无机与合成化学教育部重点实验室 广州 510006)

Selective Transformations of Carbonyl Derivatives via Selenium Catalysis

Zhong, Fuming Zhao, Xiaodan*

(Institute of Organic Chemistry & Key Laboratory of Bioinorganic and Synthetic Chemistry of the Ministry of Education, School of Chemistry, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510006)

含硒化合物具有独特的化学性质, 能够作为催化剂实现各种不同的化学转化, 为有机化合物的合成提供了便利^[1]. 近几年, 硒催化受到越来越多的关注, 已经发展成几种不同的分支, 例如 Lewis 碱性的硒醚催化、亲电的硒 π 酸催化以及氧硒酸催化等^[2]. 其中, 利用双氧水、氧气或者空气作为氧化剂的氧硒酸催化, 为有机化合物的合成提供了相对绿色的合成途径, 在精细化工品的绿色合成中表现出潜力. 扬州大学化学化工学院俞磊课题组近年来一直致力于硒催化绿色合成方面的研究, 最近, 他们从绿色合成的角度出发, 对氧硒酸催化羰基衍生物的选择性转化进行了总结和展望^[3].

羰基衍生物广泛存在于天然产物、药物和精细化工产品中, 其合成、转化特别是特定位点的高选择性反应研究具有重要意义. 该综述归纳了采用廉价氧化剂如双氧水、氧气或者空气的硒, 在催化条件下羰基衍生物在特定位点发生的四类反应, 分别为: Baeyer-Villiger 氧化生成酯类化合物, 羰基 α -H 氧化生成 α -羰基缩醛, 醛肟脱水生成有机腈类化合物, 醛肟、酮肟脱水合成相应的醛或者酮(Scheme 1).

硒催化 Baeyer-Villiger 氧化反应最早于 1989 年被 Syper 等^[4]报道. 反应中, 以亚硒酸为催化剂, H_2O_2 为氧化剂, 实现了芳香醛到酚的转化. 之后报道的硒催化 Baeyer-Villiger 氧化反应, 能够采用二硒醚为催化剂前体, H_2O_2 为氧化剂, 实现了环己酮到 ϵ -己内酯、 α,β -不饱和酮到烯基酯、靛红到靛红酸酐的合成转化. 在这类反应起始阶段, 二硒醚能够被 H_2O_2 氧化为过氧亚硒酸. 过氧亚硒酸进攻底物中的碳氧双键的碳中心, 随后发生重排得到氧化产物, 生成的亚硒酸再次被氧化为过氧亚硒酸进入下一个催化循环(Scheme 2a). 当底物分子中存在碳碳双键时, 可能会发生碳碳双键环氧化的竞争反应, 通过调节硒催化剂上连接基团的吸电子能力及空间位阻, 可以控制过氧亚硒酸进攻碳氧双键碳中心的速率, 实现化学选择性. 与传统的 Baeyer-Villiger 氧化反应相比, 硒催化以 H_2O_2 为氧化剂, 且水是唯一的副产物, 氧化条件更加绿色.

羰基 α -H 相对较为活泼, 其官能团化是有机合成中醛、酮转化的重要研究方向. 1990 年 Tiecco 等^[5]报道了硒催化甲基酮生成 α -羰基缩醛的反应, 该反应使用了催

图式 1 催化羰基衍生物的选择性转化

Scheme 1 Catalytic selective transformations of carbonyl derivatives

* Corresponding author. E-mail: zhaoxd3@mail.sysu.edu.cn. Published online December 10, 2021.

图式 2 羰基衍生物选择性转化催化机理

Scheme 2 Catalytic mechanisms on selective transformations of carbonyl derivatives

化量的二苯基二硒醚以及过量的过硫酸铵。最近研究发现,以分子氧作为氧化剂,用催化量的二苯基二硒醚和溴化亚酮可以实现 α -羰基缩醛的合成^[6]。反应过程可能是硒催化剂的前体首先转化成亲电的活性硒物种,再与甲基酮的烯醇式发生反应,在 α 位引入含硒基团,进而发生氧化和重排,生成 α -羰基醛与醇缩合生成最后的产物(Scheme 2b)。类似地,以分子氧为氧化剂的硒-铜共催化体系,也能够实现从 α -卤代酮到 α -羰基缩醛的合成。与使用化学氧化剂如 *m*-CPBA 的传统方法相比,以分子氧为氧化剂的硒催化过程显然更加环保。

有机腈类化合物是有机合成中的重要中间体,开发绿色安全的合成路线具有重要意义。研究发现,采用催化量缺电子二芳基二硒醚作为催化剂前体, H_2O_2 作为氧化剂,醛肟能够有效脱水生成腈类化合物^[6]。在此过程中,催化剂前体二芳基二硒醚首先被氧化为一价硒物种 $ArSeOH$,脱水后得到酸酐 $ArSeOSeAr$ 。随后 $ArSeOSeAr$ 向肟羟基进行亲电进攻,经过重排形成硒亚砷,顺

式消除后得到目标产物。重新生成的 $ArSeOH$ 进入下一个催化循环(Scheme 2c)。当二芳基二硒醚的芳环上含有拉电子基团时,能够提高 $ArSeOSeAr$ 硒中心的贫电性,有利于对肟羟基的进攻。相应地,当醛肟底物的富电性增强时,也将提高肟羟基的亲核能力,促进脱水产物的生成。考虑到 H_2O_2 的稳定性可能导致潜在的安全问题,研究发现采用苯基亚硒酸 $PhSe(O)OH$ 作为催化剂前体时不需要使用 H_2O_2 。反应中,苯基亚硒酸在体系中容易被溶剂等还原为活性硒物种 $PhSeOH$ 。为避免 $PhSeOH$ 被进一步还原为二硒醚而失活,该反应需在敞口体系下进行。与传统的醛肟脱水过程相比,硒催化模式条件温和,不需要使用脱水试剂,原子利用率高。

醛肟、酮肟可以直接脱水生成相应的羰基化合物。当以二硒醚为催化剂前体时,其首先被氧化为亚硒酸,随即进攻肟的 sp^2 碳中心,重排得到羰基化合物以及另一硒物种,后者脱去一分子 HNO ,生成的 $RSeOH$ 进入下一个催化循环(Scheme 2d)。当硒催化剂连接硒中心基团的富电性增强或者硒催化剂的空间位阻减小时,催化剂更容易进攻肟的 sp^2 碳中心,有利于脱水产物的生成。然而,当肟的位阻过大时,硒催化剂将难以进攻 sp^2 碳中心。而对醛肟类底物而言,底物与硒催化剂的位阻大小和富电性决定了主要发生的是脱水反应还是脱肟反应。分子氧与催化量金属的搭配,也可以代替氧化剂 H_2O_2 的作用。与传统的酸性脱肟体系相比,硒催化减少了反应废料的生成。

总之,该综述让读者了解到硒催化羰基衍生物的选择性转化的进展,也让读者了解到硒催化能够与绿色的氧化剂结合,为化合物的绿色合成提供了可能的途径。

References

- [1] Singh, F. V.; Wirth, T. *Catal. Sci. Technol.* **2019**, 9, 1073.
- [2] Liao L.; Zhao, X. *Synlett* **2021**, 32, 1262.
- [3] Xiao, X.; Guan, C.; Xu, J.; Fu, W.; Yu, L. *Green Chem.* **2021**, 23, 4647.
- [4] Syper, L. *Synthesis* **1989**, 167.
- [5] Tiecco, M.; Testaferri, L.; Tingoli, M.; Bartoli, D. *J. Org. Chem.* **1990**, 55, 4523.
- [6] Chen, C.; Cao, Z.; Zhang, X.; Li, Y.; Yu, L.; Jiang, X. *Chin. J. Chem.* **2020**, 38, 1045.

(Lu, Y.)